

川崎市で記録されたピロウドハマキ

岩田 芳美*¹

Record of *Cerace xanthocosma* Diakonoff from Kawasaki City

Yoshimi Iwata*¹

ハマキガ科のピロウドハマキ *Cerace xanthocosma* Diakonoff は本来は暖地性の種であるが、高桑(2000)によると太平洋側での北限は茨城県にまで達しているようである。

神奈川県内では三浦半島や真鶴半島、鎌倉市、横浜市中区で記録がされている。

今回、川崎市の海岸部から20kmほど内陸に位置する、川崎市宮前区にある県立東高根森林公園での目撃の情報が、照内実氏より寄せられたので、県内に於ける一番北及び内陸部の記録として報告をする。

写真の撮影も照内実氏である。

1 ♂ 1 ♀ (目撃), 15. VI. 2000, 宮前区神木本町.

ピロウドハマキの発生は6月と9月の年2回である。今後の分布域の拡大を注目していきたい。

参考文献

井上寛, 杉繁郎, 黒子博, 森内茂, 川辺甚(1982). 日本産蛾類題図鑑. 1, 996pp. II, 552pp(講談社) 東京
高桑正敏(2000). ピロウドハマキを横浜市円海山付近で採集. 神奈川虫報, (131): 54.



ピロウドハマキ

* 1 かわさき自然調査団