

## 多摩川中流域宿河原周辺の鳥類調査

佐野悦子\*・大橋毅\*・細田理絵\*・水田茂子\*・高中健一郎\*\*

Wild birds around Shukugawara in the middle reaches of the Tama River, Kawasaki City, Kanagawa prefecture

Etsuko Sano\*, Takeshi Oohashi\*, Rie Hosoda\*, Shigeko Mizuta\* and Kenichiro Takanaka\*\*

## はじめに

かわさき自然調査団野鳥班は1986年1月から川崎市の鳥類調査を実施し、これまでに川崎市内で確認された鳥類について川崎市自然環境調査報告書および青少年科学館紀要にて公表している(宇野ほか, 1988; 野鳥班, 1991; 木下・野鳥班, 1994; 木下ほか, 1996; 三谷ほか, 1999; 高橋・野鳥班, 1999; 佐野・野鳥班, 2003; 松原ほか, 2007; 佐野・野鳥班, 2007; 佐野・野鳥班, 2011; 佐野ほか, 2016; 平賀, 2020; 佐野ほか, 2023; 佐野ほか, 2025)。

本稿では2017年度から2024年度の多摩川宿河原での定例カウント調査(以下、定例とする)を中心に、1986年1月から2025年3月までの多摩川中流域宿河原周辺で得られた鳥類の確認種について、定例以外(以下、定例外とする)で出現した鳥類も含め取りまとめた。

## 材料および方法

調査地域は上流の小田急小田原線の多摩川橋梁から下流の東名多摩川橋までの多摩川右岸河川敷および多摩川中流域である(図1)。調査地域には多摩川本流のほか、川に沿った池、砂利の河川敷、草原、耕作地、河畔林など多様な環境がある。なお、2019年の台風で流路が大きく変わった。

調査は月1回の定例を多摩川宿河原周辺で2017年度から実施した。ただし、コロナ禍により2020年度、2021年度については、定例を実施していない。調査コースは図1に黒線で示したように、二ヶ領せせらぎ館脇の二ヶ領用水取水口から宿河原堰に出て、主に水鳥を観察後、河畔林・雑木林を経てサイクリング道路沿いに球技グラウンドから再び多摩川本流に戻り宿河原堰そばの舟島稲荷神社までとした。

確認できた種は日本鳥類目録改訂第8版(日本鳥学会, 2024)に従い種類順に並べた。また、神奈川県レッドデータブック生物調




図1. 多摩川中流域宿河原周辺(<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.621809/139.572802/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)

\*特定非営利活動法人かわさき自然調査団

Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation

\*\*川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) Kawasaki Municipal Science Museum

表 1. 多摩川中流域宿河原周辺の鳥類

種名	学名	1983年1月か ら2017年3月	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	定例合計
ヒシクイ	<i>Anser fabalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
マガン	<i>Anser albifrons</i>	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
コハクチョウ	<i>Cygnus columbianus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オンドリ	<i>Aix galericulata</i>	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-
トモエガモ	<i>Sibirionetta formosa</i>	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
シマアジ	<i>Spatula querquedula</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
ハシビロガモ	<i>Spatula clypeata</i>	-	18	21	-	○	○	2	16	26	83
オカヨシガモ	<i>Mareca strepera</i>	○	186	251	117	○	○	322	598	613	2087
ヨシガモ	<i>Mareca falcata</i>	-	1	-	-	○	-	-	-	-	1
ヒドリガモ	<i>Mareca penelope</i>	○	324	386	405	○	○	225	413	409	2162
アメリカヒドリ	<i>Mareca americana</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルガモ	<i>Anas zonorhyncha</i>	○	135	141	141	○	○	141	161	144	863
マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>	○	90	112	48	○	○	149	154	117	670
オナガガモ	<i>Anas acuta</i>	○	75	54	18	○	○	57	41	39	284
コガモ	<i>Anas crecca</i>	○	887	973	392	○	○	896	1179	618	4945
アメリカコガモ	<i>Anas crecca carolinensis</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
アカハシハジロ	<i>Netta rufina</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>	-	-	-	-	○	-	14	5	9	28
キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>	-	59	48	-	○	○	14	13	4	138
スズガモ	<i>Aythya marila</i>	-	1	2	-	-	-	-	1	-	4
ホオジロガモ	<i>Bucephala clangula</i>	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-
ミコアイサ	<i>Mergellus albellus</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
カワアイサ	<i>Mergus merganser</i>	○	-	-	-	-	-	2	2	2	6
ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウライアイサ	<i>Mergus squamatus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キジ	<i>Phasianus versicolor</i>	-	2	-	-	○	-	-	-	-	2
アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
ヒメアマツバメ	<i>Apus nipalensis</i>	○	445	66	23	○	○	90	17	9	650
ツツドリ	<i>Cuculus optatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	○	46	34	24	○	○	16	35	29	184
クイナ	<i>Rallus indicus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バン	<i>Gallinula chloropus</i>	○	9	1	-	-	-	-	○	○	10
オオバン	<i>Fulica atra</i>	○	551	384	245	○	○	458	356	331	2325
ヒクイナ	<i>Zapornia fusca</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	○	38	38	28	○	○	28	35	23	190
アカエリカイツブリ	<i>Podiceps grisegena</i>	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>	○	27	37	11	○	○	17	34	43	169
ミミカイツブリ	<i>Podiceps auritus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハジロカイツブリ	<i>Podiceps nigricollis</i>	-	-	-	○	-	-	-	1	-	1
セイタカシギ	<i>Himantopus himantopus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タゲリ	<i>Vanellus vanellus</i>	○	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムナグロ	<i>Pluvialis fulva</i>	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-
ダイゼン	<i>Pluvialis squatarola</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
イカルチドリ	<i>Charadrius placidus</i>	○	11	7	8	○	○	8	10	16	60
コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>	○	4	8	6	-	○	6	8	10	42
シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チュウシャクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウロクシギ	<i>Numenius madagascariensis</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
エリマキシギ	<i>Calidris pugnax</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キリアイ	<i>Calidris falcinellus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウズラシギ	<i>Calidris acuminata</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サルハマシギ	<i>Calidris ferruginea</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
オジロトウネン	<i>Calidris temminckii</i>	○	-	○	-	-	○	1	2	1	4
ヒバリシギ	<i>Calidris subminuta</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウネン	<i>Calidris ruficollis</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	4	4
ハマシギ	<i>Calidris alpina</i>	○	-	-	-	○	-	5	-	○	5
アメリカウズラシギ	<i>Calidris melanotos</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タシギ	<i>Gallinago gallinago</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
ハイイロヒレアシシギ	<i>Phalaropus fulicarius</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>	○	20	17	29	○	○	64	59	58	247

キアシシギ	<i>Tringa brevipes</i>	○	5	9	28	-	○	25	16	31	114
アカアシシギ	<i>Tringa totanus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タカブシギ	<i>Tringa glareola</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アオアシシギ	<i>Tringa nebularia</i>	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
ミツユビカモメ	<i>Rissa tridactyla</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユリカモメ	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	○	271	161	277	○	○	17	9	14	749
ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
カモメ	<i>Larus canus</i>	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
セグロカモメ	<i>Larus vegae</i>	○	25	6	16	○	○	16	8	5	76
オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアジサシ	<i>Sternula albifrons</i>	○	14	41	30	○	○	9	11	4	109
アジサシ	<i>Sterna hirundo</i>	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
クロハラアジサシ	<i>Chlidonias hybrida</i>	○	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ハジロクロハラアジサシ	<i>Chlidonias leucopterus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナベコウ	<i>Ciconia nigra</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウミウ	<i>Phalacrocorax capillatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	○	1080	986	1241	○	○	841	1532	669	6349
ヨシゴイ	<i>Ixobrychus sinensis</i>	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ゴイサギ	<i>Nycticorax nycticorax</i>	○	9	-	-	○	○	-	-	4	13
ササゴイ	<i>Butorides striata</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
アカガシラサギ	<i>Ardeola bacchus</i>	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-
アマサギ	<i>Bubulcus ibis</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	○	134	131	99	○	○	78	85	60	587
ダイサギ	<i>Ardea alba</i>	○	68	129	70	○	○	66	57	42	432
チュウサギ	<i>Ardea intermedia</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
コサギ	<i>Egretta garzetta</i>	○	220	367	195	○	○	97	149	116	1144
ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>	○	1	○	1	○	○	6	5	4	17
ツミ	<i>Accipiter gularis</i>	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-
ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>	○	1	2	4	○	○	2	3	3	15
オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>	-	2	3	1	○	○	○	2	2	10
ハイイロチュウヒ	<i>Circus cyaneus</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
トビ	<i>Milvus migrans</i>	○	32	18	42	○	○	29	35	42	198
サシバ	<i>Butastur indicus</i>	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
ノスリ	<i>Buteo japonicus</i>	-	○	-	○	-	-	1	5	4	10
アオバズク	<i>Ninox japonica</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コミミズク	<i>Asio flammeus</i>	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-
カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	○	10	6	7	○	○	15	9	25	72
アリスイ	<i>Jynx torquilla</i>	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
コゲラ	<i>Yungipicus kizuki</i>	○	6	14	7	○	○	3	6	9	45
アカゲラ	<i>Dendrocopos major</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>	○	12	○	-	○	○	6	4	4	26
ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>	○	1	○	1	-	○	○	1	1	4
サンコウチョウ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
モズ	<i>Lanius bucephalus</i>	○	24	19	15	○	○	22	29	30	139
オナガ	<i>Cyanopica cyanus</i>	-	7	6	○	-	○	6	17	13	49
ハンボソガラス	<i>Corvus corone</i>	○	379	345	344	○	○	323	314	294	1999
ハンブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>	○	68	71	64	○	○	42	30	26	301
ヒレンジャク	<i>Bombicilla japonica</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
シジュウカラ	<i>Parus cinereus</i>	○	120	102	137	○	○	80	83	114	636
ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i>	○	11	6	2	-	○	3	-	2	24
ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	○	188	195	168	○	○	203	158	284	1196
ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	○	137	71	87	○	○	95	105	58	553
イワツバメ	<i>Delichon dasyopus</i>	-	-	-	1	○	○	44	46	24	115
コシアカツバメ	<i>Cecropis daurica</i>	○	○	-	-	○	○	77	5	5	87
ウグイス	<i>Horornis diphone</i>	○	29	27	22	○	○	44	41	38	201
エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4
オオムシクイ	<i>Phylloscopus examinandus</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
オオヨシキリ	<i>Acrocephalus orientalis</i>	-	19	2	-	-	○	2	1	1	25
コヨシキリ	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
セッカ	<i>Cisticola juncidis</i>	○	33	10	12	○	○	27	24	25	131
メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	○	50	33	103	○	○	38	51	67	342
ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	○	440	192	286	○	○	156	192	284	1550
コムクドリ	<i>Agropsar philippensis</i>	-	○	1	-	-	-	-	○	4	5
シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>	-	○	-	1	○	-	-	-	-	1

アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i>	○	1	2	2	-	○	-	-	-	5	
ツグミ	<i>Turdus eunomus</i>	○	97	120	40	○	○	24	63	19	363	
ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureoreus</i>	○	4	14	12	○	○	3	3	9	45	
イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>	○	○	-	1	○	○	3	2	2	8	
ノビタキ	<i>Saxicola stejnegeri</i>	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	
スズメ	<i>Passer montanus</i>	○	814	437	624	○	○	256	251	314	2696	
ツメナガセキレイ	<i>Motacilla tschutschensis</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マミジロツメナガセキレイ	<i>Motacilla tschutschensis tschutschensis</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>	○	9	6	6	○	○	9	9	13	52	
ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	○	88	128	118	○	○	205	264	242	1045	
セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>	○	34	49	70	○	○	40	41	49	283	
ビンズイ	<i>Anthus hodgsoni</i>	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
タヒバリ	<i>Anthus rubescens</i>	○	17	37	23	○	○	26	38	26	167	
シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	○	6	6	13	○	○	1	2	○	28	
イカル	<i>Eophona personata</i>	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウソ	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベニマシコ	<i>Carpodacus sibiricus</i>	○	3	4	-	-	-	-	-	-	7	
カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>	○	129	177	173	○	○	144	177	80	880	
マヒワ	<i>Spinus spinus</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	○	60	44	46	○	○	10	34	37	231	
ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i>	○	4	-	-	○	○	○	-	-	4	
ミヤマホオジロ	<i>Emberiza elegans</i>	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
アオジ	<i>Emberiza personata</i>	○	26	45	63	○	○	31	74	55	294	
オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	
コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コジュケイ	<i>Bambusicola thoracicus</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
ドバト	<i>Columba livia</i>	○	927	418	957	○	○	1474	1719	2452	7947	
コウノトリ	<i>Ciconia boyciana</i>	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワカケホンセイインコ	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i>	-	16	20	34	○	○	17	17	28	132	
シマキンバラ	<i>Lonchura punctulata</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ニワトリ	<i>Gallus gallus domesticus</i>	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
出現種 合計			98	82	70	62	66	72	86	74	77	160
定例出現鳥類種			-	69	63	57	-	-	67	66	69	88
定例外出現鳥類			-	13	7	5	66	72	19	8	8	72
定例個体数合計			-	8563	7043	6938	-	-	7135	8867	8144	46690

\*R は留鳥、S は夏鳥、W は冬鳥、T は通過鳥、A は台風等 (若鳥等の分散途中と思われる記録を含む) による迷行を示す。

査報告書 2006 (高桑ほか, 2006) に記載されている種については該当のランクを記載し、繁殖期を (繁)、非繁殖期を (非) とした。また、2017 年度から 2024 年度の定例の内、12 ヶ月すべてを実施した年度では一年のカウント数を記入したほか、定例外で出現した鳥類については「○」で示した (表 1)。なお、種の説明に記載した渡り区分については、神奈川鳥類目録VII (日本野鳥の会神奈川支部, 2020) を基に記載した。

## 結果

表 1 に示したとおり、2017 年度から 2024 年度で確認した鳥類は 36 科 88 種になった。これに 1986 年 1 月から 2017 年 3 月までに確認した鳥類を加えると 44 科 160 種になった。図 2 に 2017 年度から 2024 年度の定例および定例外での総種類数の変化を示すと、期間中は概ね 70 種前後が確認され、2022 年

度が 86 種で最も多く、2019 年度が 62 種で最も少なかった。総個体数の変化をみると、2023 年度が 8867 羽で最も多く、2019 年が 6938 羽で最も少なかった (図 3)。

多摩川宿河原には、冬の渡り鳥としてカモ科の飛来が多い。定例で確認された冬鳥として飛来するカモ科のうち総個体数の多




図 2. 宿河原における鳥類総種類数の推移




図 3. 宿河原定例調査における鳥類総個体数の推移

かった 5 種を図 4 に示す。オカヨシガモ *Mareca strepera* は計 2087 個体が確認され、2024 年度が最も多く 613 個体、2019 年度が最も少なく 117 個体であり、近年増加傾向にある (表 1、図 4)。ヒドリガモ *Mareca penelope* は計 2162 個体が確認され、2023 年度が 413 個体と最も多く、2022 年度が 225 個体と最も少なかったが、あまり変化はない (表 1、図 4)。マガモ *Anas platyrhynchos* は計 670 個体が確認され、2023 年度が最も多く 154 個体、2019 年度が 48 個体と最も少なかったが、概ね 100 個体前後で推移している (表 1、図 4)。オナガガモ *Anas acuta* は計 284 個体が確認され、2017 年度が最も多く 75 個体、2019 年度が最も少なく 18 個体となり、近年は 50 個体前後で推移している (表 1、図 4)。コガモ *Anas crecca* はカモ科の中で最も個体数が多く、計 4945 個体が確認され、2023 年度が 1179 個体と最も多く、2019 年度が 392 個体となり最も少なかったが、概ね 800 個体前後を推移している (表 1、図 4)。

オオバン *Fulica atra* は主に冬鳥として飛来し、計 2325 個体が確認された。最も多かったのが 2017 年度の 551 羽で、最も少なかったのが 2019 年度の 245 羽であり、300 羽前後で推移している (図 5)。ユリカモメ *Chroicocephalus ridibundus* は冬鳥として飛来し、計 749 個体が確認された。最も多かったのが 2019 年度の 277 羽で、最も少なかったのが 2023 年度の 9 羽であり。2017 年度から 2019 年度までは毎年 220 羽前後が確認されていたが、2022 年度から 2024 年度までは 10 羽で前後し、減少傾向にある (図 6)。コアジサシ *Sternula albifrons* は神奈川県で (繁) 絶滅危惧 I 類に指定されており、砂




図 4. 宿河原定例調査における冬鳥カモ科 5 種の個体数推移




図 5. 宿河原定例調査におけるオオバン *Fulica atra* の個体数推移




図 6. 宿河原定例調査におけるユリカモメ *Chroicocephalus ridibundus* の個体数推移

浜や河川など本種の繁殖地は減少している (高桑ほか, 2006)。夏鳥として飛来し、砂礫地などで集団繁殖する。計 109 個体が確認された。最も多かったのが 2019 年度の 30 羽で、最も少なかったのが 2024 年度の 4 羽であった。宿河原周辺では 2017 年 5 月、6 月、2019 年 5 月、2020 年 7 月には営巣、幼鳥の記録があるが、2022 年度以降は急激に少なくなっている (図 7)。ツバメ *Hirundo*

*rustica* は、夏鳥として飛来する。計 553 個体が確認され、最も多かったのが 2017 年度の 137 羽で、最も少なかったのが 2024 年度の 58 羽であった (図 8)。神奈川県では (繁) 減少種に指定されており (高桑ほか, 2006)、減少傾向にある。

各年度で個体数が多く確認されたカワウ *Phalacrocorax carbo*、ドバト *Columba livia* の個体数について記す。カワウは計 6349 個体が確認され、最も多かったのが 2023 年度の 1532 羽で、最も少なかったのが 2024 年度の 669 羽であった (図 9)。カワウは次々と移動することが多く、一斉移動に遭遇した場合と、遭遇していない場合では全体の個体数が変わってくることから、月に一度の定例では、なかなか把握することができないと思われる。ドバトは計 7947 個体が確認され、最も多かったのが 2024 年度の 2452 羽で、最も少なかったのが 2018 年度の 418 羽であった (図 10)。エサを撒く人がいるように近年増加傾向にある。




図 7. 宿河原定例調査におけるコアジサシ *Sterna albifrons* の個体数推移




図 8. 宿河原定例調査におけるツバメ *Hirundo rustica* の個体数推移




図 9. 宿河原定例調査におけるカワウ *Phalacrocorax carbo* の個体数推移




図 10. 宿河原定例調査におけるドバト *Columba livia* の個体数推移

### 宿河原の特徴的な種について

確認種の中から神奈川県レッドデータブック生物調査報告書 2006 (高桑ほか, 2006) で絶滅危惧I類、絶滅危惧II類、準絶滅危惧に指定されている種を中心に宿河原の特徴的な種を取り上げる。

#### クイナ *Rallus indicus*

神奈川県では (非) 絶滅危惧 II 類に指定されている。冬鳥で、2013 年 11 月に二ヶ領せせらぎ館上流の池で 1 個体が冬眠中のカエルを掘り出し食べたのが観察された (大野私信)。

#### ヒクイナ *Zapornia fusca*

神奈川県では (繁) 絶滅危惧 I 類に指定されている。夏鳥で、2022 年 6 月に二ヶ領せせらぎ館上流の池で観察された。水浴び、採食をしていた。

#### タゲリ *Vanellus vanellus*

神奈川県では (非) 絶滅危惧 II 類に指定されている。冬鳥で 2011 年 11 月 (大野私信) と 2022 年 11 月の定例で飛んでくると

ころが観察された。

#### イカルチドリ *Charadrius placidus*

神奈川県では(繁)準絶滅危惧および(非)注目種に指定されている。留鳥で、定例では毎年確認されており、2022年7月には幼鳥1個体が親鳥2個体と歩いているのが観察された。

#### キョウジョシギ *Arenaria interpres*

神奈川県では(非)絶滅危惧II類に指定されている。通過鳥で、定例では2022年5月に川で採食しているのが観察された。

#### トウネン *Calidris ruficollis*

神奈川県では(非)絶滅危惧II類に指定されている。通過鳥で1989年5月に8個体、2009年8月に1個体、2011年11月に1個体が観察され、2024年9月には4個体がコンクリートブロックの上で採食しているのが観察された。

#### キアシシギ *Tringa brevipes*

神奈川県では(非)絶滅危惧II類に指定されている。通過鳥で、ほぼ毎年確認されているが、年による個体数の変動が大きい。最も多かったのが2024年度の31羽で、最も少なかったのが2017年度の5羽であった。

#### ミサゴ *Pandion haliaetus*

神奈川県では(繁)絶滅危惧II類および(非)準絶滅危惧に指定されている。留鳥で、定例および定例外で確認されており、2023年10月と2024年2月には川に飛び込み魚を両足で捕らえ飛び去る様子が観察されている。近年多摩川中流域ではよく見られるようになった。

#### ツミ *Accipiter gularis*

神奈川県では(繁)絶滅危惧II類および(非)希少種に指定されている。留鳥で、定例外で確認され、2017年4月と2023年1月には川辺の木に止まっているのが観察された(大野私信)。

#### オオタカ *Accipiter gentilis*

神奈川県では(繁)絶滅危惧II類および(非)希少種に指定されている。留鳥で、定例および定例外で確認されており、2019年1月、2020年10月、2020年11月、2022年

2月にはドバトを追っているのが観察された。また、2023年11月、2024年1月にはカラスに追われているのが観察された。

#### サシバ *Butastur indicus*

神奈川県では(繁)絶滅危惧I類に指定されている。夏鳥で、2021年4月と2022年9月に上空を飛び去るのが観察されている(大野私信)。

#### ノスリ *Buteo japonicus*

神奈川県では(繁)絶滅危惧II類および(非)希少種に指定されている。冬鳥で、定例では2018年2月、2020年1月、2022年12月、2023年11月、2024年1月に観察され、2024年2月には木に止まりハシボソガラスに周りを囲まれる姿を、2024年12月にはハシボソガラスに追われる姿を、2025年1月、2月、3月には上空を飛ぶところが観察された。

#### ハヤブサ *Falco peregrinus*

神奈川県では(繁)絶滅危惧I類および(非)希少種に指定されている。留鳥で、2014年以降、ほぼ毎年確認されており、2017年3月にはドバトの捕獲を失敗する姿を、2017年8月には水浴びする姿を、2022年1月には若鳥がドバトの群れに突っ込む様子が観察された。

#### オオヨシキリ *Acrocephalus orientalis*

神奈川県で(繁)絶滅危惧II類に指定されている。夏鳥で、最も多かったのが2017年度の19羽であったが、それ以降は少なく、2024年度には1羽となった。

#### アオジ *Emberiza personata*

神奈川県では(繁)絶滅危惧II類に指定されている。冬鳥で、定例では毎年確認されている。最も多かったのが2023年度の74羽で、最も少なかったのが2017年度の26羽であった。

#### オオジュリン *Emberiza schoeniclus*

神奈川県では(非)絶滅危惧II類に指定されている。冬鳥で、定例外では2012年2月、定例では2021年4月、2022年3月、2023年3月の記録がある。

## おわりに

著者ら以外にもかわさき自然調査団野鳥班の伊藤撰、大森洋子、亀岡千佳子、佐々木麻子、佐藤裕子、下條喜代子、正田康子、竹本直彦、瀧孔一郎、中村亨、平賀孝政、福田公子、細田健二、森佳子、吉村浩二(五十音順)が調査へ参加した。多摩川宿河原周辺にて2017年度から2024年度で確認した鳥類は36科88種であり、1983年1月から確認した鳥類を加えると44科160種となった。同地域は大雨、台風などにより流路が大きく変わることがある。それに伴って今までの草原が一瞬に石ころだらけの河原になったり、時を経て新たな場所に草原ができたりする。また河川及びその周辺の工事が環境を大きく改変してきた。このような多摩川の環境変化が鳥類の種類や数および行動にどう影響を及ぼすのかなどを長期的に見ていきたい。

## 謝辞

二ヶ領せせらぎ館周辺で野鳥撮影の活動をされている大野章氏には情報の提供など、多大なご協力をいただいた。ここに厚く御礼申し上げます。

## 引用文献

平賀孝政, 2020. 生田緑地におけるオオタカの繁殖について. 川崎市青少年科学館紀要, (30): 21-22.  
木下あけみ・三谷頼吾・野鳥班, 1996. 川崎市生田緑地のオオルリ繁殖例について. 川崎市青少年科学館紀要, (7): 27-32.  
木下あけみ・野鳥班, 1994. 川崎市生田緑地の野鳥とその季節的消長. 川崎市自然環境調査報告 III, 177-188. 川崎市教育委員会.  
松原迪郎・佐野悦子・野鳥班, 2007. 多摩川河口鳥類の記録. 川崎市自然環境調査報告VI, 159-171. 川崎市教育委員会.  
三谷頼吾・高橋小百合・野鳥班, 1999. 多摩川河口干潟に於ける鳥類の生息調査. 川崎市自然環境調査報告IV, 29-54. 川崎市

教育委員会.

日本鳥学会 (編), 2024. 日本鳥類目録 改訂第8版. 506 pp., 日本鳥学会, 東京.  
日本野鳥の会神奈川支部 (編), 2020. 神奈川の鳥 2011-15 -神奈川県鳥類目録 VII-, 685pp., 日本野鳥の会神奈川支部, 横浜.  
佐野悦子・大橋毅・水田茂子・高中健一郎, 2023. 川崎市生田緑地の鳥類調査. 川崎市青少年科学館紀要, (33): 39-50.  
佐野悦子・大橋毅・水田茂子・高中健一郎, 2025. 川崎市生田緑地およびその周辺の鳥類調査. 川崎市青少年科学館紀要, (35): 30-38.  
佐野悦子・大橋毅・瀧孔一郎・中村亨・平賀孝政・水田茂子・森佳子, 2016. 川崎市生田緑地の野鳥-4. 川崎市自然環境調査報告 VIII, 85-103. 川崎市教育委員会.  
佐野悦子・野鳥班, 2003. 川崎市生田緑地の野鳥とその季節的消長III. 川崎市自然環境調査報告 V, 182-197. 川崎市教育委員会.  
佐野悦子・野鳥班, 2007. 川崎市生田緑地及び川崎国際生田緑地ゴルフ場の鳥類. 川崎市自然環境調査報告 VI, 132-147. 川崎市教育委員会.  
佐野悦子・野鳥班, 2011. 川崎市生田緑地の鳥類-3. 川崎市自然環境調査報告 VII, 75-87. 川崎市教育委員会.  
高橋小百合・野鳥班, 1999. 川崎市生田緑地の野鳥とその季節的消長 II. 川崎市青少年科学館紀要, (10): 41-57.  
高桑正敏・勝山輝男・木場英久 (編), 2006. 神奈川県レッドデータブック生物調査報告書 2006. 442 pp., 神奈川県立生命の星・地球博物館, 小田原.  
宇野美苗・金井キミ子・佐野悦子・宮永光子・増淵和夫, 1988. 川崎市丘陵部の野鳥とその季節的消長. 川崎市自然環境調査報告書 I, 105-114. 川崎市教育委員会.  
野鳥班, 1991. 川崎市の野鳥目録. 川崎市環境調査報告書 II, 155-177. 川崎市教育委員会.